

Załącznik do zezwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Nr R - 14 /2007 z dnia 18.04.2007 r.

Podmiot, który uzyskał pozwolenie: CHEMINOVA A/S P.O. Box 9, DK-7620 Lemvig,
Dania, telefon: 00 45 969 096 90, fax: 00 45 969 096 91

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
CHEMINOVA Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 212 A, 02-486 Warszawa
Telefon: (0-prefiks-22) 571 40 50, fax: (0-prefiks-22) 571 40 51

**Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia
ryzyka dla ludzi i środowiska.**

I M P A C T 125 SC

Środek grzybobójczy koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie zbóż ozimych i jarych oraz rzepaku ozimego przed chorobami grzybowymi.

Zawartość substancji aktywnej:

flutriafol/(RS)-1-(2-fluorofenylo)-1-(4-fluorofenylo)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilo)-etanol
(związek z grupy triazoli) - **125 g w 1 litrze środka.**

Zezwolenie MRiRW Nr R - 14 /2007 z dnia 18. 04. 2007 r.



Szkodliwy



Niebezpieczny dla środowiska

Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

Działa szkodliwie po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.



Uwaga!

- 1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.**
- 2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.**

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Rośliny rolnicze.

Zboża ozime i jare.

pszenica ozima.

- mączniak prawdziwy, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew.

pszenżyto ozime, żyto.

- mączniak prawdziwy, rdza brunatna.

Zalecana dawka: 1-1,25 l/ha.

Środek w dawce 1,25 l/ha stosować przy dużym nasileniu chorób oraz septoriozie liści i plew.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecana opryskiwanie: drobnokropliste.

pszenica jara, pszenżyto jare, jęczmień ozimy.

- mączniak prawdziwy.

Zalecana dawka: 1-1,25 l/ha.

Wyższą dawkę środka stosować przy dużym nasileniu choroby.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecana opryskiwanie: drobnokropliste.

jęczmień jary.

- mączniak prawdziwy, rdza karłowa, plamistość siatkowa jęczmienia.

Zalecana dawka: 1-1,25 l/ha.

Wyższą dawkę środka stosować przy dużym nasileniu chorób.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecana opryskiwanie: drobnokropliste.

Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób:

- **pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto:** od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kłoszenia.
- **pszenica jara, pszenżyto jare, jęczmień jary:** od końca fazy krzewienia do fazy pęcznienia kłosa.

Rzepak ozimy.

od początku kwitnienia do opadania pierwszych płatków kwiatowych.

- szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, czerni krzyżowych.

Zalecana dawka: 1 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecana opryskiwanie: drobnokropliste.

Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób.

UWAGA:

W celu zapobiegania możliwości pojawienia się odporności środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

OKRES KARENCCI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji): pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, pszenżyto jare, jęczmień ozimy, jęczmień jary, żyto, rzepak ozimy- 35 dni.

OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): **NIE DOTYCZY.**

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI I ZWIERZĄT (okres zapobiegający zatruciu): **NIE DOTYCZY.**

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Ściśle przestrzegać właściwego dawkowania środka. Zawartością opakowania przed użyciem energicznie wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z włączonym mieszadłem, następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wleciu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w pojemnikach szczelnie zamkniętych, w chłodnym dobrze wentylowanym miejscu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż +30°C.

Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.

Unikać zanieczyszczenia skóry.

Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.

Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.

Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

Pomoc medyczna

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (0-prefiks-58) 301 65 16

Rzeszów – (0-prefiks-17) 866 44 09

Kraków - (0-prefiks-12) 411 99 99

Sosnowiec – (0-prefiks-32) 266 11 45

Lublin – (0-prefiks-81) 740 26 76

Warszawa – (0-prefiks-22) 619 08 97

Łódź – (0-prefiks-42) 657 99 00

Wrocław – (0-prefiks-71) 343 30 08.

Poznań – (0-prefiks-61) 847 69 46

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -