

Załącznik do zezwolenia MRiRW Nr R- 44 /2008  
Z dnia 28.05. 2008 r.

**Podmiot, który uzyskał zezwolenie: CHEMINOVA A/S P.O.,** Box 9, DK-7620 Lemvig,  
Dania, tel.: 00 45 969 096 90, fax: 00 45 969 096 91

**Podmiot wprowadzający środek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:**

Cheminova Polska Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 212 A, 02-486 Warszawa, tel.: +48 (0-22) 571 40 50, fax: +48 (0-22) 571 40 51, e-mail: mfo.pl@cheminova.com

**Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin  
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska**


## RUBRIC 125 SC

Zawartość substancji aktywnej:

**epoksykonazol/rac-1-[3-(2-chlorofenylo)-2,3-epoksy-2-(4-fluorofenylo)-propylo]-1H-1,2,3-triazol (związek z grupy triazoli) - 125 g w 1 litrze środka.**

Inne substancje niebezpieczne nie będące substancją aktywną: „solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory ciężkie aromatyczne; frakcja naftowa niespecyfikowana”.

**Zezwolenie MRiRW Nr R-44 /2008 z dnia 28.05.2008 r.**



**Szkodliwy**



**Niebezpieczny dla środowiska**

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe.

Ograniczone dowody działania rakotwórczego.

Możliwe ryzyko upośledzenia płodności.

Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.

Działa szkodliwie, może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.



### **UWAGA!**

- Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.**
- Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.**

## I OPIS DZIAŁANIA

RUBRIC 125 SC jest środkiem grzybobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczenia wodą o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie zbóż ozimych i jarych przed chorobami grzybowymi.

## II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

### 1. PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME

mączniak prawdziwy, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza liści, septorioza plew, czerń kłosów.

### 2. JĘCZMIENŃ OZIMY

mączniak prawdziwy.

### 3. ŻYTO

mączniak prawdziwy, rdza brunatna.

### 4. JĘCZMIENŃ JARY

rdza karłowa jęczmienia, rynchosporioza, plamistość siatkowa liści jęczmienia.

Zalecana dawka: 1 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

### 5. STOSOWANIE ŁĄCZNE

Środek **Rubric 125 SC** można stosować w mieszaniu ze środkami:

Sparta 250 EW lub Riza 250 EW:

- **pszenica ozima, pszenżyto ozime** /mączniak prawdziwy, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza liści, septorioza plew/
- **jęczmień ozimy** /mączniak prawdziwy/
- **żyto** /mączniak prawdziwy, rdza brunatna/

Zalecane dawki:

Rubric 125 SC: **0,75 - 1 l/ha** + Sparta 250 EW lub Riza 250 EW: **0,5 l/ha**.

W mieszaniu, wyższą z zalecanych dawek środka Rubric 125 SC stosować przy dużym nasileniu chorób.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób:

- **pszenica, pszenżyto**: od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia,
- **jęczmień ozimy i jary**: od końca fazy krzewienia do końca fazy kłoszenia,
- **żyto**: od początku fazy strzelania w źdźbło do początku fazy kłoszenia.

UWAGI:

Środek stosować w temperaturach powyżej 12° C.

Pszenżyta nie opryskiwać w okresie kwitnienia.

Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

## III OKRES KARENCJI

okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji

PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME, JĘCZMIENŃ OZIMY, ŻYTO, JĘCZMIENŃ JARY: -  
35 DNI.

#### **IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZOŁ**

okres zapobiegający zatruciu

NIE DOTYCZY.

#### **V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ**

Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

#### **VI PRZECHOWYWANIE**

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C, z dala od źródeł ciepła.

Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

#### **VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA**

- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
- W razie poknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza pokaż opakowanie lub etykietę.
- Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
- Resztki nie zużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

#### **UWAGA!**

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

#### **VIII ANTIDOTUM**

BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

#### **IX POMOC MEDYCZNA**

W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (0-58) 349 28 31  
Kraków – (0-12) 411 99 99  
Lublin – (0-81) 740 89 83  
Łódź – (0-42) 657 99 00  
Poznań – (0-61) 847 69 46

Rzeszów – (0-17) 866 40 25  
Sosnowiec – (0-32) 266 11 45  
Tarnów – (0-14) 631 51 77  
Warszawa – (0-22) 619 66 54  
Wrocław – (0-71) 343 30 08

Okres ważności - 2 lata  
Data produkcji - .....  
Zawartość netto - .....  
Nr partii - .....