

Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 123 /2008 z dnia 05.08.2008 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW Nr 713/2000 z dnia 13.04.2000 r.

Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Cheminova Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 212A,
02-486 Warszawa, tel.:(022)571 40 50, fax.:(022) 571 40 51, e-mail:
marta.fogg@cheminova.com

**Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia
ryzyka dla ludzi i środowiska**

T A R C Z N I K B R

Zawartość substancji aktywnej:
dimetoat /ditiiofosforan 0,0-dimetylo-S-metylokarbamoilometylu
(związek z grupy fosforoorganicznych) - 0,38%.

Zezwolenie MRiRW Nr 713/2000 z dnia 13.04.2000 r.
zmienione decyzją MRiRW Nr R - 652/2003/p z dnia 17.10.2003 r.
decyzją MRiRW Nr R - 256/2004o z dnia 18.05.2004 r.
decyzją MRiRW Nr R-187/2007 z dnia 27.04.2007 r.
decyzją MRiRW Nr R- 301/2007 z dnia 28.06.2007 r.
oraz decyzją MRiRW nr R- 123/2008 z dnia 05.08.2008 r.



Uwaga:

1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

I OPIS DZIAŁANIA

Tarcznik BR jest środkiem owadobójczym w formie brykietu przeznaczonego do kontrolowanego uwalniania substancji aktywnej w podłożu pod wpływem wody, o działaniu żołądkowym i kontaktowym przeznaczonym do zwalczania szkodników takich jak: czerwce, tarcznieki, mączlik szklarniowy, wełnowce i mszyce występujących na częściach nadziemnych roślin ozdobnych uprawianych przez amatorów w mieszkaniach i na balkonach.

W roślinie działa systemicznie.

II ZAKRES, TERMINY STOSOWANIA I DAWKI

1. Rośliny ozdobne (mieszkania, balkony)

czerwce, tarcznieki, mączlik szklarniowy, wełnowce i mszyce występujące na częściach nadziemnych roślin

Środek można stosować przez cały rok po wystąpieniu szkodników.

Brykiet umieścić w odległości 3 cm od korzeni rośliny wciskając go w podłoże, tak aby całkowicie był przykryty. Po zabiegu rośliny obficie podlać wodą.

Dawkowanie uzależnione jest od:

a) średnicy doniczki:

do 12 cm – 1 brykiet

do 15 cm – 2 brykiety

powyżej 15 cm – 3 brykiety.

b) liczby roślin balkonowych w skrzynce:

na 1 roślinę lub 12 cm długości skrzynki 1 brykiet.

W przypadku dobrze zwilżonego podłoża środek zaczyna działać po upływie 3-7 dni.

UWAGA!

Nie stosować środka na chryzantemy.

III OKRES KARENCJI

okres od zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji

NIE DOTYCZY

IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ

okres zapobiegający zatruciu

NIE DOTYCZY

V PRZECHOWYWANIE

Chronić przed dziećmi.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 25°C.

Przechowywać z dala od promieni słonecznych.

VI WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu
- Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
- Opróżnione opakowania po środku traktować jako odpady komunalne.
- Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.

UWAGA!

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VII OBJAWY ZATRUCIA

Pocenie, ból głowy, osłabienie, zawroty głowy, mdłości, ból żołądka, wymioty, zwężenie źrenic, zaburzenie wzroku, drżenie mięśni.

VIII PIERWSZA POMOC

Jeśli wystąpiły jakiegokolwiek spośród wyżej wymienionych objawów, zwłaszcza jeśli znana jest przyczyna skażenia: przerwać pracę, zdjąć skażoną odzież, umyć skażoną skórę i włosy, nie dopuścić do jakiegokolwiek wysiłku, natychmiast wezwać lekarza i pokazać etykietę.

Zalecenie dla lekarza:

1. Jeśli występują oznaki i objawy, możliwie jak najszybciej wstrzyknąć 2 mg siarczanu

atropiny (w przypadku dzieci w paru dawkach) i powtarzać (gdy to konieczne) dopóty, dopóki nie nastąpi pełna atropinizacja.

2. Jeśli to możliwe, podać 1 g pralidoksyny domięśniowo. Powtórzyć po 3-4 godz.

Inne środki zaradcze:

1. Zapewnić dostęp świeżego powietrza.

2. Obserwować oddech - możliwe, że będzie konieczna intubacja endotrachealną rurką lub tracheotomia w połączeniu ze sztucznym oddychaniem.

3. Zapewnić pacjentowi pełny odpoczynek i hospitalizować co najmniej 24 godziny.

IX POMOC MEDYCZNA

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (0-58) 349 28 31

Warszawa – (0-22) 619 66 54

Rzeszów – (0-17) 866 40 25

Łódź – (0-42) 657 99 00

Kraków - (012) 411 99 99

Wrocław – (0-71) 343 30 08.

Sosnowiec – (0-32) 266 11 45

Poznań – (061) 847 69 46

Lublin – (0-81) 740 89 83

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -